

三糖铁琼脂培养基

Triple Sugar Iron Agar Medium

用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选。

货号：K0016-250g



1、适用范围

应用	类别
生化鉴定	肠杆菌

2、原理和用途

胨和牛肉浸出粉是氮源，提供生长所必需的维生素、矿物质和氨基酸。TSI 含有葡萄糖、蔗糖和乳糖三种可发酵糖；酚红作为 pH 指示剂；当这些糖类发酵时，颜色变黄表示产酸，变红表示产碱。只能利用葡萄糖的细菌，葡萄糖被分解产酸使斜面先变黄，但因量少，生产的少量酸。因接触空气而氧化，加之细菌生长利用培养基中含氮物质，生成碱性产物，故斜面后来又变红。底部由于厌氧状态，酸类不被氧化，仍保持黄色。而发酵乳糖的细菌，则产生大量的酸，使整个培养基呈黄色；某些细菌能分解含硫氨基酸，硫代硫酸钠被还原成硫化氢，与铁盐反应生成黑色的硫化铁；硫酸亚铁是 H₂S 指示剂；氯化钠用来维持均衡的渗透压；琼脂是固化剂。

在 TSI 琼脂中添加 1%蔗糖可以区分变形杆菌和沙门氏菌。变形杆菌对蔗糖发酵使酚红指示剂的颜色从红色变为黄色。葡萄糖阳性和乳糖阴性的沙门氏菌都会引起斜面变红，使琼脂管深处酸化。

3、配方（g/L）

胨	20.0g
葡萄糖	1.0g
蔗糖	10.0g
氯化钠	5.0g
酚磺酞	0.025g
硫酸亚铁	0.2g
牛肉浸出粉	5.0g
硫代硫酸钠	0.2g
乳糖	10.0g
琼脂	12.0g
最终 pH 值（25℃）	7.3±0.1

4、配制方法

称取本品 63.4g, 置于 1L 纯化水中, 加热搅拌至完全溶解, 分装于试管中 121℃ 高压灭菌 15min, 制成高底层 (2-3cm) 短斜面, 备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡粉色
制备好培养基颜色	红色透明固体
最终 pH 值 (25℃)	7.3±0.1

6、微生物测试

根据《中国药典》检测: 大肠埃希氏菌、福氏志贺氏菌、乙型副伤寒沙门氏菌和普通变形杆菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	A/A, 产气, H ₂ S 阴性
福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572	K/A, 不产气, H ₂ S 阴性
乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	K/A, 产气, H ₂ S 阳性
普通变形杆菌 CMCC(B)49027	A/A, 产气, H ₂ S 阳性

接种方法: 定性;

培养条件: 30-35℃/18-24h, A 表示产酸, 培养基变黄, K 表示产碱, 培养基变红。

7、储存条件

常温, 密封, 存放于阴凉干燥处; 保质期三年。

8、参考标准

《中国药典》

9、注意事项

称取培养基时, 请做好必要的防护措施, 以免引起身体不适。

培养基应置于避光、干燥处保存, 使用后应立即旋紧瓶盖, 以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号